

Ruta botànica d'Alaquàs

Parc de la Sequieta



Ficus rubiginós
Ficus rubiginosa var australis

Port: arbre perennifoli de 10–25 m d'altura, copa arrodonida de 10–20 m d'ample.
Tronc: gruixut. De les branques més baixes pengen nombroses arrels aèries. Escorça llisa marró groguenca.
Fulles: simples, ovades, per l'anvers verd fosc brillant i el revers glabre i verd tomentós i rubiginós.
Flors: sense interès, són de color blanquinós.
Fruits: siconis globosos menuts, de color groc a vermell fosc, que maduren preferentment a la primavera i a l'estiu.



Bauhínia purpúria
Bauhinia purpurea

Port: arbre caducifoli de 3–10 m d'altura, copa arrodonida, irregular, de 3–8 m d'ample.
Tronc: escorça llisa i finament fissurada, gris.
Fulles: simples, bilobades, grandària mitjana, verd mat. Perd el fullatge a finals d'hivern.
Flors: tardor–principi d'hivern. Molt vistoses, oloroses, de color porpra, rosa, lavanda o blanc, disposades en rams de 6–12 flors.
Fruits: llegums marrons, allargats i ondulats, que romanen a l'arbre fins a finals d'hivern.



Tipuana
Tipuana tipu

Port: arbre de fulles tardanament caduques, de 9–30 m d'altura, de copa arrodonida o en forma de para-sol de 15–25 m d'ample.
Tronc: escorça solcada, gris marronosa i branques flexuoses.
Fulles: compostes, pinnades, amb l'anvers verd i el revers verd groguenc.
Flors: juny–juliol. Color groc carabassa, reunides en inflorescències que formen rams pènduls.
Fruits: llegums alats de color marró clar quan maduren a la tardor i es mantenen a l'arbre fins a l'hivern.



Bellaombra
Phytolacca dioica

Port: arbre semiperennifoli, de 8–15 m d'altura, copa estesa o arrodonida de 6–15 m d'ample.
Tronc: tortuós i no llenyós. Branques herbàcies molt trencadisses. Fusta esponjosa, de textura paperosa. A la base, una munió d'arrels superficials, molt poderoses, formen una peanya que s'engrandeix amb l'edat. Escorça llisa, gris clar.
Fulles: simples, el·líptiques, grans, per l'anvers verd mitjà o fosc i pel revers verd més clar.
Flors: dioica. Juny. Unisexuals, de color blanc crema, agrupades en rams pènduls allargats.
Fruits: baies globoses, marró clar, agrupades en infructescències pèndules. La saba és tòxica.



Eritrina cresta de gall
Erythrina crista-galli

Port: arbre caducifoli, de 5–10 m d'altura, de copa arrodonida o en forma de para-sol, de 6–8 m d'ample.
Tronc: tortuós d'escorça rugosa, fissurada, gris clar i branques espinoses. Branques que floreixen s'assequen després de la fructificació.
Fulles: compostes, trifoliades, per l'anvers verd fosc i pel revers verd mitjà, amb espines al nervi mitjà i del pecíol.
Flors: juny–juliol. Sovint refloreix al setembre–octubre. De color roig brillant, disposades en rams vistosos.
Fruits: llegums llenyosos marró fosc, que maduren a la tardor.



Washingtonia robusta
Washingtonia filifera

Les dos espècies tenen fulles en forma de ventall. La filifera és més baixeta (fins 18 m), d'estípit (tronc de les palmeres) més gros i base més eixamplada. En les fulles s'observen uns filaments que li donen nom. Aquestes fulles també són més grans i les inflorescències més llargues que les de la robusta. La robusta és més alta (fins 25 m), amb un tronc més esvelt i prim. En el cas de les flors de la filifera son blanquinoses i les de la robusta rosades o color crema. D'adultes és fàcil diferenciar-les, però de joves es prou més complicat. T'atreveixes?